

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)
Şarj numarası: (damga)

Ruhsatname tarihi ve numarası: 26.03.2013/9151

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	Zararlı organizma adı	Uygulama Dozu	Son uygulama ile hasat arasındaki süre
ELMA	Yaprak bitleri (A.pom), D.plonagireus, D.dereveta, M. persicae, H.pruni, P.persicae)	100 ml/100 L su	7 gün
	Armut kaptanı (Stephanitis pyri)	80 ml/100 L su nımf-ergen	
	Elma pamukludibi (Eriosoma lanigerum)	100 ml/100 L su nımf-ergen	
	Ağaç sarıkanlı (Zuzera pyrina)	150 ml/100 L su larva	
ŞEFTALİ	Şeftali virgül kabuğu bit (Nasutaspis halii)	150 ml/100 L su larva	7 gün
ERİK, KAYISI, ŞEFTALİ, BADEM, VIŞNE	Fidan dipkurdu (Capnodis spp.)	200 ml/100 L su ergen, larva	7 gün
ANTEPİSTİĞİ	Yaprak zerik (Pilocorus stali)	150 ml/100 L su	7 gün
	Antepistigisi psilidi (Agonoscena pistaciae)	150 ml/100 L su nımf-ergen	
	Antepistigisi kılıcı (Schneideneria (=Recursaria) pistacicola)	150 ml/100 L su larva	
	Antepistigisi meyve içkuru (Megastipnus pistaciae)	150 ml/100 L su	
	Antepistigisi güldürkü (Thaumetopoea solitaria)	150 ml/100 L su larva	
ZEYTİN	ZeYTİN çiçek sapı sokanları (Calocoris erivania, C. annulipes)	150 ml/100 L su nımf	21 gün
	ZeYTİN güvesi (Prays oleae)	100 ml/100 L su larva (Yaprak veya çiçek dolüne) 150 ml/100 L su larva (meyve dolüne)	
	ZeYTİN kılavuş böceği (Agalmatum flavescens)	150 ml/100 L su nımf	
	ZeYTİN kurdusu (Coenorrhinus coryli/parisi/olivae/medicaginis/robor)	150 ml/100 L su ergen	
	ZeYTİN pamukludibi (Euphyllura spp.)	150 ml/100 L su nımf-ergen	21 gün
	ZeYTİN sineği (Bactrocera oleae)	100 ml/100 L su larva-ergen (Zehirli yem kısmı kaçama) 750 ml ilaç+4000 ml protein hidroliyatı/ha larva, ergin	
GÜL	Yaprak bitleri (Aphididae)	75 ml/100 L su ergen-nımf	7 gün
	Yağ gülünde yaprak bit (Macrosiphum rosae)	75 ml/100 L su ergen-nımf (tomurcuklar gillende)	
	Gül frözürgüsü (Anis brumicentrus)	100 ml/100 L su ergen-larva	
GLAYÖL	Çiçek soğanları (Rhagothrips echinopsi)	100 ml/100 L su ergen-larva (soğanlar bantları)	7 gün
SUSAM	Susam gövesi (Antigona californica)	100 ml/da larva	7 gün
KAVAK	Kavaklarca küçük beke böceği (Saperda pectinifera)	200 ml/100 L su ergen-larva	7 gün
PAMUK	Pamukta bitli tahtakuruları (Eolyptus gemellatus, E. pratorius, Creonitidae palidus)	100 ml/da ergen-nımf	7 gün
	Pamuk yaprak bit (Aphis gossypii)	100 ml/da nımf	
	Emici böcekler (Lycus spp.)	100 ml/da	
	Pamuk yaprak parçaları (Empoasca decipiens, Asymmetrus decedens)	100 ml/da	

PlatinKimya
DICENTRA
Emülsiyon Konsantre(EC)

Grubu	1 B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
400 g/l. Dimethoate		

- Önce Etiket Okuyunuz.
- Evde Kullanmayınız.
- Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.
- Bitki Koruma Ürününün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.
- Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 7 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.
- İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

- KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJININ İÇİNE ¼'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder. Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görmede bozukluk ve bulanıklık, halsizlik, ishal, solunum zorluğu, terleme, salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaslarda seğirme, kasılma ve refleks bozukluğu. Diğer zararlılık belirtileri "Zararlılık ifadeleri (H)" bölümünde verilmiştir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Net miktar: (kg veya L)
Azami perakende satış fiyatı:
İÇİNDEKİLER
Dimethoate, Ksilen
ZARARLILIK İŞARETLERİ:



Uyarı kelimesi: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

H302 Yutulması halinde zararlıdır.
H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.
H315 Cilt tahrişine yol açar.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P270 Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin.
P273 Çevreye verilmesinden kaçın.
P280 Koruyucu kıyafet, eldiven, göz ve yüz koruyucu kullanın.
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P312 Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P332+P313 Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir. Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi
Platin Kimya
Mühürsallık ve Ticaret A.Ş.

07 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Ümit ÖZGÜR DANCER
Daire Başkanı

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan BKÜ önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yanya kadar suyla doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden BKÜ ve su karışımı depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmaktadır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İlaçlama Makinesinin Temizliği: Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Uygulama esnasında bitki en iyi şekilde ıslanmalı, yer aletlerine yaprak altı memeleri takılmak suretiyle yaprak alt yüzeylerinin de ıslanması sağlanmalıdır.

Elma—Yaprak bitleri: Vegetasyon süresi boyunca 100 sürgünde 5-15 arası sürgünde bulaşık görüldüğünde veya sürgünlerde 5-10 koloni görüldüğünde ilaçlama yapılmalıdır. Meyve ağaçlarında yaprakbitlerine karşı genel olarak çiçekten önce ve yazın ilaçlama yapılmalıdır.

Elma- Armut kaplani: Nisan ayından itibaren erginlerin kışlaklarından çıkıp yapraklara geçtiği, fakat henüz yumurta bırakmadığı dönemde 10 ağacın farklı yönündeki birer sürgünden alınan toplam 100 yaprakta ergin sayısı, yaprak başına ortalama 1 adet olduğunda ilk ilaçlamaya karar verilir. 1. Döl nimflerinin yoğun olduğu haziran ayında yukarıdaki yöntemle ergin ve nimfler sayılır. Yaprak başına ortalama 2-4 adet ergin ve nimf mevcut ise, 2. ilaçlama yapılır. Gerekirse temmuz sonu veya ağustosun ilk haftasında 2.bir ilaçlama yapılır.

Elma- Ağaç sarıkkurdu: Mayıs ayında asılan izleme tuzaklarında ilk ergin yakalandıktan sonra ki 14-16. günlerde (haziran ayı) ilaçlama yapılmalıdır. Tuzaklarda erginler yakalanmaya devam ettiğinde ağustos ayında 2. ve Ekim ayında 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Fidan dipkurtları: Zararlı tespit edilirse; ergin mücadelesi mayıs-haziran aylarında (hava sıcaklıkları 25-26°C olmadan) yeşil aksam kaplama şeklinde ilaçlama yapılmalıdır. Larva mücadelesi ise haziran, temmuz, ağustos aylarında, zararlıların yumurtalarını koyduğu dönemde, her 15 günde bir kök boğazından itibaren aşı noktası dâhil 1 m. çapında yüzey ilaçlaması yapılmalıdır.

Şeftali- Şeftali virgül kabuklubiti: Yazın ise, nisan sonundan itibaren yapılan kontrollerde ilk hareketli larvalar görüldükten 1-2 hafta sonra 1. ilaçlama ve ilacın etki süresi dikkate alınarak 2. ilaçlama yapılır.

Antepfıstığı- Şıralı zenk: Nimflere karşı yaz aylarında yapılacak uygulama zamanının saptanması için 10 ağaçta 100 meyve salkımı kontrol edilir ve meyve salkımı başına 25 yumurta izi sayıldığında ilaçlama yapılması gerektiğine karar verilir. Yumurtaların % 50 oranında açıldığı mayıs ortası ile haziranın ilk haftası arasında ilaçlama yapılır. Erginlere karşı kış aylarında yapılacak mücadele ise Şubat-Mart aylarında sürgünlerde erginler görüldüğünde, gözler patlamadan 20 gün önce ilaçlama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı psilidi: Mayıs ayı başından itibaren haftalık olarak 100 bileşik yaprakta yapılan sayımlar sonucu yaprak başına 20-30 nimf görüldüğünde, yumurtaların büyük çoğunluğu açıldığında ve ilk ergin parazitoid çıkışı ve yaprak yüzeyinde yapışkan tabaka (fumajin) olmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Antepfıstığı- Antepfıstığı içgüvesi: Kimyasal uygulama kışlayan dölün yani birinci neslin larvalarına karşı yapılmalıdır. 10 ağacın değişik yönlerinden meyve salkımları kontrol edilmeli, meyvelerdeki bulaşma oranının % 3'ü bulması durumunda uygulamaya karar verilmelidir.



Emülsiyon Konsantre(EC)

Grubu	1 B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	-----	--------------------------

400 g/l. Dimethoate

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

Solunması halinde: Kazazedeyi kirlenme kaynağından uzaklaştırın. Solunum zorluğu şekildiğinde, uygun eğitilmiş personel tarafından kazazedeye oksijen verilebilir.

Yutulması halinde: Bilinci kapalı olan kişiye asla ağızdan bir şey vermeyin.

Kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. Kirlenmiş giysileri çıkarın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Göz teması halinde: Hemen bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve göz kapaklarını iyice açın. Tıbbi yardım alın. Gözlerinizi ovmayın.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

ANTİDÖTÜ: ATROPİN SÜLFAT VE TOXOGONİN'dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg.'dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile BKÜ'nün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar BKÜ'nün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar BKÜ'nün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş.

Maslak Mah Ahi evran cad. Polaris Plaza No :21/26

Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

FABRİKA ADRESİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No : 38 Döğemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Suna ARSLAN

Ziraat Mühendisi



07 Şubat 2019
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Antepfıstığı meyve iç kurdu: Ağaç üzerinde kalmış veya toprağa dökülmüş bir yıl öncesine ait 300 meyve mart-nisan aylarında kontrol edilir. Meyve içinde saptanan canlı larva oranı % 10 ise kimyasal uygulama yapılmalıdır. Mayıs ayından itibaren yapılan kontrollerle ergin çıkışı izlenir. İlk ergin çıkışının görülmesinden bir hafta sonra uygulamaya başlanır.

Antepfıstığı gözkurdu: Yapılan kontrollerde ağaç başına 2-3 yumurta paketi bulunan bahçeler bulaşık sayılır. Bahçede ağaçların % 50'si bulaşık ise bahçenin tamamı, bu oran daha düşük ise yalnız bulaşık ağaçlara uygulama yapılmalıdır. Yumurtaların patlama döneminde, yumurtalardan çıkışlarını tamamlamış birinci ve ikinci dönem larvalarına karşı nisan ayı başından sonuna kadar uygulama yapılır.

Zeytin çiçek sap sokanı: Zeytin çiçek sap sokanı mücadelesi zeytin güvesi çiçek nesli mücadelesi ile aynı zamana rastladığından, zeytin güvesi için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur. Zeytin güvesi mücadelesi yapılmayan bahçelerde, zeytinin çiçek açma zamanında, nisan sonu mayıs başlarında, ağaç başına yaklaşık 25 adet zararlı saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Zeytin güvesi: Zararının çiçek dönünde uygulama tavsiye edilmemektedir. Ancak ürünün az olduğu yıllarda mevsim başında yaprak ve yeni sürgünlerde % 10'dan fazla zarar görüldüğünde çiçek dönünde ilk kelebelerin yakalanmasından 7-10 gün sonra çiçek dönünde bir uygulama yapılır. Tercihen sadece meyve dönüne karşı uygulama yapılmalıdır. Kontrol edilen mercimek büyüklüğündeki meyvelerin % 10'unda canlı "yumurta+larva" olduğunda uygulama yapılır.

Zeytin kırlangıç böceği: Diğer zararlılara karşı yapılan kimyasal uygulamalar ile bu zararlıya karşı uygulanan mekanik mücadele zararlıyı baskı altında tutmaktadır. Kimyasal mücadeleye gerek duyulmamaktadır.

Zeytin kurdu: Yapılacak kontroller sonucunda bir ergin dahi görülse uygulamaya başlamak gerekir.

Zeytin pamuklu biti: İlaçlamanın mutlaka gerekli olması halinde zeytin pamuklu bitinin en uygun mücadele zamanı, sürgün uçlarında ilk pamuklanmalar görüldükten 10 gün sonra başlamak üzere çiçeklenme zamanına kadar olan dönemdir. Zeytin güvesi çiçek nesli için mücadele yapılan bahçelerde, bu zararlı için ayrı bir uygulamaya gerek yoktur.

Zeytin sineği: Meyvelerin yumurta koyma olgunluğuna geldiği dönemde vuruk sayımları yapılarak, yeterli vuruk ve tuzaklarda yakalanan zeytin sineği ergin sayısında artış görülmesi halinde uygulamaya geçilir. Vuruk sayıları haftada 1-2 kez, ağaçların güney-doğu kısımlarındaki parlak, yağlanmaya başlamış, flüoresan sarı renkteki en az 1000'er meyvede yapılarak, vuruk yüzdesi belirlenir. Yapılan sayımlarda salamuralık çeşitlerde % 1 vuruk, yağlık çeşitlerde % 6-8 vuruk saptandığında, yer aletleriyle zehirli yem kısmi dal uygulaması veya kaplama uygulama yapılmalıdır.

Gılaydi çiçek soğanı akarı: Söküm zamanı soğanlar kesilerek kontrolleri yapılır, % 20 bulaşma varsa mücadeleye geçilir.

Gül yaprak biti: Yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20'sinde sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprak biti kolonileri görülmeye başladığı zaman uygulamaya geçilmelidir.

Gül filiz burgusu: Genellikle erginlerin ve ilk larva zararının görüldüğü mart sonu ile nisan ortasında, % 5 zarar saptandığında kimyasal mücadele yapılmalıdır.

Susam güvesi: Zararlı ile bulaşık bitki oranı % 20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Kavaklarda küçük teke böceği: Larvaların henüz oduna ulaşmadığı yeni bulaşmalarda Mayıs-Temmuz aylarında 20 gün ara ile iki ilaçlama yapılmalıdır.

Pamukta bitki tahtakuruları: Taraklanma başlangıcından sonra 100 generatif organda 4 zararlı bulunduğu, kozaların % 80'den fazlasının olgunlaştığı dönemde ise *C. pallidus*'ün bu bu dönemdeki zararının önemli olmaması nedeniyle diğer iki tür için 100 generatif organda 20 zararlı olduğunda uygulama yapılmalıdır.



Emülsiyon Konsantre(EC)

Grubu	1 B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	-----	--------------------------

400 g/l. Dimethoate

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :
PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi evran cad. Polaris Plaza No :21/26
Sarıyer /İstanbul
Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778
FABRİKA ADRESİ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde
No : 38 Döşemealtı/ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi

Platin Kimya
Mümessillik ve Dış Ticaret A.Ş.

07 Subat 2019

Ümit Uğur TAÇÇE
Daire Başkanı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ÇEVRE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Pamuk yaprakbiti: Fide döneminde seyreltmeden sonra % 50 bulaşık fide, tarla döneminde ise bir yaprakta ortalama 25 yaprakbiti saptandığında kimyasal mücadele önerilir.

Pamuk yaprak pireleri: Surveylerde 50 da'lık bir pamuk tarlası 4 bölüme ayrılır. Her bölümden rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine alt alt orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprak pireleri sayılır. Bu şekilde tüm alanda toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprak piresi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ

DICENTRA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre **Grup 1 B** olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **DICENTRA'nın** aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (**Grup 1 B** hariç) bitki koruma ürünleri kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU

Deltamethrin terkipli bitki koruma ürünleri ile karışabilir



Emülsiyon Konsantr(EC)

Grubu	1 B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	-----	--------------------------

400 g/l. Dimethoate

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA :

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş
Maslak Mah Ahi evran cad. Polaris Plaza No :21/26

Sarıyer /İstanbul

Tel : (0 212) 346 0777 (pbx) Fax : (0212) 3460778

FABRİKA ADRESİ

Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde

No : 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

Suna ARSLAN
Ziraat Mühendisi



07 Şubat 2019

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.