

İmal Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Sarj No:  
Ruhsat Tarih ve No.su: 09.08.2012/8807

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR**

| Bitki Adı        | Zararlı Organizma Adı   | Uygulama Dozu ve Dönemi   |
|------------------|---|---|
| Kırmızı Mercimek | Ayrık ( <i>Elymus repens</i> )  | 100 ml/da<br>Mercimek 8-12 cm boyda,<br>yabancı otlar 2-4 yapraklı<br>olduğu dönemde, çıkış sonrası                               |
|                  | Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Kısır yabancı yulaf ( <i>Avena sterilis</i> )<br>Kendi gelen arpa ( <i>Hordeum vulgare</i> )<br>Kendi gelen buğday ( <i>Triticum aestivum</i> )   | 75 ml/da<br>Mercimek 8-12 cm boyda,<br>yabancı otlar 2-4 yapraklı<br>olduğu dönemde, çıkış sonrası                                |
| Pamuk            | Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )   | 75-100 ml/da<br>Tohumdan gelenlerde düşük,<br>Rizomdan gelenlerde yüksek<br>doz uygulanır   |
| Soya Fasulyesi   | Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Köpekdişi ayırığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Kuşyemi ( <i>Phalaris spp.</i> )<br>Yabancı darı ( <i>Panicum spp.</i> )<br>Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> ) | 100 ml/da<br>Yabancı otların 3-6 yapraklı<br>olduğu devrede, çıkış sonrası  |
| Domates          | Köpekdişi ayırığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )   | 100 ml/da<br>Domatesler 15-20 cm boyda,<br>otlar 3-6 yapraklı dönemde,<br>çıkış sonrası   |
| *Bağ             | Köpekdişi ayırığı ( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )  | 100 ml/da.<br>Köpek dişi 15-20 cm,<br>kanyaş 2-3 kardeşle iken  |
| Şeker Pancarı    | Tilkikuyruğu ( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Yabancı yulaf ( <i>Avena fatua</i> )<br>Pusküllü çayır ( <i>Bromus tectorum</i> )<br>Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )  | 75-100 ml/da<br>Yıllık yabancı otlarda düşük,<br>çok yıllık yabancı otlarda<br>yüksek doz uygulanır.                              |
| Soğan            | Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Yapışkan darı ( <i>Setaria spp.</i> )<br>Kanyaş ( <i>Sorghum halepense</i> )   | 100 ml/da<br>Soğan 15-20 cm boyda,<br>kanyaşlar 3-5 yapraklı,<br>darıcan ve yapışkan darılar<br>10-15 cm boyda oldukları<br>dönem |

**PlatinKimya**  
**MIDFIELD 5 EC**  
Emülsiyon Konsantre (EC)

**Grubu A, I HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)**

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

**Önce Etiketi Okuyunuz.**

**Evde Kullanmayınız.**

**Çocuklardan, Gıda Ve Hayvan Yemlerinden Uzak Tutunuz.**

**Bitki Koruma Ürünü'nün Uygulanması Sırasında Hiçbir Şey Yemeyiniz, İçmeyiniz, Sigara Kullanmayınız.**

**Bitki Koruma Ürünü Uygulanmış Sahaya 1 Gün İnsan Ve Hayvan Sokmayınız.**

**İnsan Ve Çevre Sağlığı Üzerine Riskleri Önlemek İçin, Tavsiye Edildiği Şekilde Ve Tavsiye Edildiği Dozda Kullanınız.**

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR**

**Kullanılan Ürünün Boş Ambalajlarının İçine 1/4'üne Kadar Temiz Su Koyarak İyice Çalkalayınız. Çalkalama Suyunu İlaçlama Tankına Boşaltınız. Bu İşlemi 3 Sefer Tekrarlayınız.**

**ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:**

Baş ağrısı, baş dönmesi, halsizlik, bulamık görme vs.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114**

Net Miktarı :

Azami perakende satış fiyatı :

**İÇİNDEKİLER**

Quizalofop-p-ethyl , Ksilen

**ZARARLILIK İŞARETLERİ :**



**Uyarı kelimesi : DİKKAT ZARARLILIK İFADELERİ:**

H226 Alevlenir sıvı ve buhar.

H302 Yutulması halinde zararlıdır.

H332 Solunması halinde zararlıdır.

H312 Cilt ile teması halinde zararlıdır.

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H413 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki yapabilir.

**ÖNLEM İFADELERİ:**

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.

P210 Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. – Sigara içilmez.

P241 Patlamaya dayanıklı, elektrikli, havalandırma ve tutuşturucu malzeme kullanın.

P261 Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P370+P378 Yangın durumunda: Söndürme için köpük, karbon dioksit veya kuru toz kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçının.

P501: İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

**KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:**

-Bitki koruma ürünü'nü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.

-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

-Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.

-Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

-Balıklara zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmayınız.

-Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR.

14 Şubat 2019



**Platin Kimya**  
Kıymetli Müşterilerimizle Birlikte  
Güven ve Kaliteyi Birlikte Yaşayalım

|          |  |   |
|----------|--|---|
| Kanola   | Delice<br>( <i>Lolium temulentum</i> )<br>Tilkikuyruğu<br>( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Kısır yabancı yulaf<br>( <i>Avena sterilis</i> )<br>Köpekdişi ayrığı<br>( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Kuşyemi ( <i>Phalaris spp.</i> )<br>Çayır püskülü ( <i>Poa spp.</i> )<br>Yapışkan darı<br>( <i>Setaria spp.</i> )<br>Kendi gelen buğday<br>( <i>Triticum aestivum</i> )                      | 200 ml/da, Çıkış sonrası<br>100 ml/da, Çıkış sonrası                                      |
| Nohut    | Tilkikuyruğu<br>( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Yabancı yulaf<br>( <i>Avena fatua</i> )<br>Kendi gelen buğday ( <i>Triticum aestivum</i> )  | 75 ml/da, Çıkış sonrası   |
| Ayçiçeği | Tilkikuyruğu<br>( <i>Alopecurus myosuroides</i> )<br>Brom ( <i>Bromus spp.</i> )<br>Köpekdişi ayrığı<br>( <i>Cynodon dactylon</i> )<br>Darıcan<br>( <i>Echinochloa crus-galli</i> )<br>Yabancı arpa<br>( <i>Hordeum spontaneum</i> ) Yabancı darı<br>( <i>Panicum spp.</i> )<br>Çayır püskülü ( <i>Poa spp.</i> )<br>Yapışkan ot ( <i>Setaria spp.</i> )<br>Kanyas<br>( <i>Sorghum halepense</i> ) | 100 ml/da<br>Ayçiçeği ve yabancı otların 3-4<br>yapraklı olduğu dönemde, çıkış<br>sonrası |

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak buğ alanlarında kullanılamaz.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

#### KALİBRASYON :

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için uygulama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

## PlatinKimya MIDFIELD 5 EC

Grubu A, I HERBİSİT (Yabancı Ot İlacı)

50 g/l Quizalofop-P-ethyl

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ :

**Genel Bilgiler ;** Kaza halinde ya da kendinizi iyi hissetmediğinizde, derhal tıbbi yardım isteyin (mümkünse etiketi gösterin).

**Yutulması halinde;** Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

**Göz ile temas halinde;** Göze değmişse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

**Deri ile temas halinde;** İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunlu su ile yıkayınız. İlaçla bulaşık elbiseleri çıkarınız.

**Solunması halinde;** Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekliyse oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağırınız.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

#### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında, açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörül (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

#### FİRMA BEYANI :

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder.Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

#### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26  
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

#### ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi I.Kısım 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114



Platin Kimya  
Müessesilik ve Dış Ticaret A.Ş.

#### ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı ve hızlı gelişme gösterdiği genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem yabancı otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişmelerinin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıkta uygulama yapılmamalıdır.

#### DİRENÇ YÖNETİMİ :

MIDFIELD 5 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A.1 olarak sınıflandırılmış bir herbistir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geçiktirmek için MIDFIELD 5 EC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A, 1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.

**Platin Kimya**  
**MIDFIELD 5 EC**

|       |     |                            |
|-------|-----|----------------------------|
| Grubu | A,1 | HERBİSİT (Yabancı Ot İlaç) |
|-------|-----|----------------------------|

50 g/l Quizalofop-p-ethyl

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

#### RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza No :21/26  
Sarıyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

#### ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A.Ş  
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde  
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

14 Şubat 2019

5. N