

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarihi ve Numarası: 13.02.2013/9083

KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma	Avrupa kırmızıörümceği (<i>Panonychus ulmi</i>)	20 ml/100 L su	28 gün
	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)		
	Akdiken akarı (<i>Tetranychus viennensis</i>)		
*Bağ	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	25 ml/100 L su	56 gün
Patlıcan	Kırmızıörümcekler (<i>Tetranychus spp.</i>)	30 ml/100 L su	3 gün
Fasulye			
Hıyar			
Kornişon			
Şeftali	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/100 L su	21 gün
Pamuk	İki noktalı kırmızıörümcek (<i>Tetranychus urticae</i>)	40 ml/da	-
Soya	Kırmızıörümcek (<i>Tetranychus cinnabarinus</i>)	40 ml/da	-

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken ilaçlı su depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanincaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgârsız veya az rüzgârlı hava koşullarında yapılmalıdır. Hazırlanan karışım her tarafını kaplayacak şekilde püskürtülür.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.


PlatinKimya
PEAK 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	10A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek ilacı)
-------	-----	---------------------------------

500 g/l Clofentezine

Önce etiketi okuyunuz.

Evde kullanmayınız.

Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.

Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.

Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya insan ve hayvan girmesinde sakınca yoktur.

İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

Kullanılan ürünün boş ambalajının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir, muhtemelen halsizlik görülür. Yüksek miktarlarda alındığı takdirde göz ve deride yanmalara sebebiyet verir.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

08-02-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net miktarı:
Azami perakende satış fiyatı:

İÇİNDEKİLER
Clofentezine

ZARARLILIK İŞARETLERİ:



UYARI KELİMESİ: DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P280 Koruyucu eldiven/ koruyucu kıyafet/ göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanın
P301+P312 YUTULDUĞUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın.
P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak serin ve kuru bir yerde, çocuklardan ve gıda maddelerinden uzakta muhafaza ediniz.
- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yer üstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

KULLANMADAN ÖNCE İYİCE ÇALKALAYINIZ!

PLATIN KİMYA
Mühürsellik ve Tic. A.Ş.
AYŞE TUMAY
Ziraat Mühendisi

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma – Kırmızıörümcek ve akarlar: Mayıs ayı başından itibaren 100 yaprakta periyodik olarak yapılacak sayımlarda yaprak başına ortalama 8-10 adet canlı birey görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bağ-İki noktalı kırmızıörümcek: Mücadelede popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 5-8 adet hareketli bireyi geçtiğinde.

Hıyar, Kornişon, Patlıcan, Fasülye- İki noktalı kırmızıörümcek: Patlıcan, hıyar ve kornişonda yaprak başına ortalama 5 adet, fasülye için 3 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Şeftali- İki noktalı kırmızıörümcek: Yapılan sayımlarda, yaprak başına ortalama 3-5 adet in üzerinde kırmızıörümcek bulunması durumunda uygulama yapılmalıdır.

Pamuk- Kırmızıörümcekler: Mücadele zamanının belirlenmesi için bitkiler 4-6 yapraklıyken kontroller yapılır. Zararlı yalnız tarla kenarında ya da içinde lokal olarak bulunuyorsa sadece bu kısımlar uygulanmalıdır. Yaprak başına ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 10 adet canlı kırmızıörümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Soya- Kırmızıörümcek: Baklalar olgunlaştıktan sonra uygulama yapılmamalıdır. Bir yaprakçıkta ortalama Akdeniz Bölgesi'nde 5 adet, Ege Bölgesi'nde 10 adet kırmızıörümcek bulunduğunda kaplama ilaçlama yapılmalıdır.

PEAK 500 SC ile uygulamadan en iyi sonucun alınabilmesi iyi bir kaplama uygulama ile mümkündür. Ağaçların her tarafı bitki koruma ürünü ile yıkanır gibi ilaçlanmalıdır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PEAK 500 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 10A olarak sınıflandırılmış bir akarisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PEAK 500 SC'** in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 10A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan önce mutlaka ön karışım testi yapılmalıdır.

PlatinKimya PEAK 500 SC

Süspansiyon Konsantre (SC)

Grubu	10A	AKARİSİT (Kırmızıörümcek İlacı)
-------	-----	---------------------------------

500 g/l Clofentezine

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Soluma; Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Yutma; Kusturmayın. Şuuru yerinde olmayan bir kimseye kesinlikle sıvı bir şey vermeyin. Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Ağzı ve burnu iyice yıkayın. Herhangi bir rahatsızlığın devamı halinde, doktora başvurun.

Ciltle Temas: Kirilenmiş giysileri çıkarın. Cildi bol su ve sabunla iyice yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin gelişmesi halinde doktora başvurun.

Gözlerle Temas: Kontak lens varsa gözleri yıkamadan önce çıkarılmalıdır. Göz kapaklarını aralayarak gözleri hemen bol suyla yıkayın. En az 15 dakika durulamaya devam edin. Yıkadıktan sonra belirtilerin baş göstermesi halinde hemen doktora başvurun

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile firma bitki koruma ürününün kalitesini garanti eder. Firma bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadıklarında eksiklik neticesinde doğacak olan zarardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A. Ş
Maslak Mah. Ahi Evran Cad. Polaris Plaza Apt. No:21/26
Sarıyer /İstanbul
TEL: 0212 346 07 77 FAX: 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATİN KİMYA MÜMESSİLLİK VE DİŞ TİC.A. Ş
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım 1.Cadde No:38
Döşemealtı /ANTALYA
Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

PLATİN KİMYA
Mümessillik ve Dış Tic. A.Ş.
AYŞE TUMAY
Ziraat Yüksek Mühendisi

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) TEL: 114

08-02-2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

N. Durmuş
Dr. Nesrin ÇAKIRARICAN
Daire Başkanı