

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Seri No:
Rühsat Tarihi ve No.su: 18.04.2014 /9632

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANILACAGI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZM ADI	UYGULAMA DOZU VE DÖNEMİ	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE
Celtik	Parmak otu (<i>Abutilon theophrasti</i>) Deniz sandalye sazi (<i>Bolboschoenus maritimus</i>) Kız otu (<i>Cyperus difformis</i>) Darıcan (<i>Echinocloa crus-galli</i>) Celtiki darıcan (<i>Echinochloa oryzoides</i>) Boğumlu çobandequeği (<i>Polygonum lapathifolium</i>) Domuz pitrağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	Celtik ve yabancı otların 4 yapraklı olduğu dönemde; 5 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da Celtik ve yabancı otların 6 yapraklı olduğu dönemde; 6 ml ilaç + 10 ml surfaktan/da	-

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü ve surfaktan önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günde serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

ILAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınır. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkammasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayıza. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltınmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ KULLANMA ŞEKLİ:

PLANOMI 400 SC özel surfaktanı ile birlikte kullanılır. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için tarlanın tesviye edilmesi, ekimden sonra su seviyesinin düşük tutulması yabancı otların aynı seviyede büyümelerini sağlayacağından gereklidir. Uygulamadan bir gün önce tarladaki sular boşaltılmalıdır. Uygulamadan 2-3 gün sonra tavalar tekrar su verilir ve bu su en az 3 gün tavalarde yüksek seviyede muhafaza edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PLANOMI 400 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **PLANOMI 400 SC** nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayın. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek derecede asidik ve bazik bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz.

09 Nisan 2019

TARIM VE ORMAN İŞ KANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.



Platın Kimya PLANOMI 400 SC

Süsponsiyon Konsantre (SC)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

420 g/l Bispyribac-sodium

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜ UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SIGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA, ÜRÜN BİTKİ ÜZERİNDE KURUDUKTAN SONRA GİRİLMESİNDE BİR SAKINÇA YOKTUR.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMİR İÇİN, TAVSİYE EDİLDİĞİ ŞEKİLDE VE TAVSİYE EDİLEN DOZDA KULLANINIZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınır. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Yutulması halinde

Yutulması halinde derhal doktora başvurunuz. İlaç ambalaj ve etiketini birlikte götürünüz.

Göz ile temas halinde

Göze dehimsse en az 15 dakika bol suyla yıkayınız.

Deri ile temas halinde

İlaçla temas eden vücut kısımlarını bol sabunu su ile yıkayınız. İlaçla buluşuk elbiseleri yıkayınız.

Solunması halinde

Hastayı açık havaya çıkarınız. Gerekiyorsa oksijen veriniz suni solunum yapınız. Doktor çağınız.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktar:

Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Bispyribac-sodium
ZARARLILIK İŞARETLERİ :



UYARI KELİMESİ : DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ

Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır.

ÖNLEM İFADELERİ

P102 Çocukları erişmemeyeceği yerde saklayın.

P273 Çevreye veillesmesinden kaçın.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P281: Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P301+P312 YUTULDUGUNDA: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktor/hekim arayın

P501 İçeriği/ kabı ulusal yönetmeliklere göre bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanımına talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Anılar zehirlidir. Çeşkendez zamanı uygulamayız, Balkır ile zehirlidir, yeralib ve yerüstü sularına bulutlamaktan kaçınırız.

Kullanmadan önce şiese iyice çalkalayınız.

İlaçta sülfatdan ilave etmeyi unutmayın.

Boş ürün ambalajlarını başka amaçla kullanmayın.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında sağlanan depolanda 2 yıl süre ile ürünün fizikal, kimyasal ve biyojolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMÀ BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydıyla, üretici ve rühsat sahibi firma ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İlaçların tavsiye dışı kullanımından doğacak zarar ve ziyanдан kullanıcı kendisini sorulur olacaktır.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMÀ:

PLATIN KİMYA MÜMƏSSİLLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Maslak Mah Ahi Evran cad. Polaris Plaza Apt
No:21/26 Sanyer /İstanbul

TEL: 0212 346 07 77 FAX : 0212 346 07 78

ÜRETİM TESİSİ:

PLATIN KİMYA MÜMƏSSİLLİK VE DİŞ TİC.AŞ
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısm 1.Cadde
No: 38 Döşemealtı/ANTALYA

Tel: 0242 258 00 70 Fax: 0242 258 00 75

ARSLAN
Platın Kimya
Yatırım ve Ticaret A.Ş.